

## التوحد

### - تعريف التوحد:

هناك تعريفات عديدة للتوحد تهدف إلى وصف فئة معينة تحمل نفس الصفات و هي فئة التوحد.

و اعتبر العالم "كانر" أول من عرف التوحد الطفولي حيث قام من خلال ملاحظته لإحدى عشر حالة بوصف السلوكيات و الخصائص المميزة للتوحد و التي تشمل على عدم القدرة على تطوير علاقات مع الآخرين و التأخر في اكتساب الكلام و استعمال غير تواصلية للكلام ونشاط اللعب و ضعف التخيل و التحليل.

و قدم "روتر" أربع خصائص لتعريف التوحد على أنه:

- إعاقة في العلاقات الاجتماعية.

- نمو لغوي متأخر أو منحرف.

- سلوك طقوسي و استحواذي.

و عرفته منظمة الصحة العالمية >>هو اضطراب نمائي يظهر قبل سن ثلاث سنوات و يبدو على شكل عجز في استخدام اللغة و في اللعب في التفاعل و التواصل الاجتماعي<<

و كلمة "Autisme" هي كلمة إغريقية تنقسم إلى

"Autos" و تعني النفس أو الذات

"Ism" و تعني الحالة الغير السوية

و بهذا فكلمة Autism هي النفس الغير السوية.

### أسباب التوحد:

منذ أن انتبه العلماء للأعراض التي سمو لها فيما بعد باضطراب التوحد مازالت الأسباب غير معروفة بصورة دقيقة و ثابتة و ذلك لعدم وجود عرض معين و يمكن حصر الأسباب فيما يلي:

### 1- أسباب نفسية:

فمنذ القدم كان الوالدان يهملون ببرودة عواطفهم تجاه الإبن و التي تسبب الإصابة بالتوحد و خصوص الأم مما أطلق عليها الأم الباردة (الثلاجة).

## 2- أسباب بيولوجية:

و هناك من يفسر التوحد نتيجة للعوامل البيولوجية، و أسباب تبني هذا المنهج بسبب أن الإصابة تكون مصحوبة بأعراض عصبية أو إعاقة عقلية.

## 3- الفيروسات و التطعيم:

أوجد العلماء علاقة بين إصابة الأم ببعض الالتهابات الفيروسية و إصابة التوحد و من هذه الالتهابات هي الحصبة الألمانية و تضخم الخلايا الفيروسية، و يرى البعض أن التطعيم قد يؤدي إلى أعراض التوحد بسبب فشل الجهاز المناعي في إنتاج المضادات الكافية للقضاء على فيروسات اللقاح مما يجعلها قادرة على إحداث تشوهات في الدماغ.

## 4- أسباب وراثية و جنينية:

إن عنصر الوراثة كسبب يفسر اضطراب التوحد و هذا يفسر إصابة الأطفال التوحديين بالاضطراب نفسه كما يشير بعض الباحثين إلى الخلل في الكروموسومات و الجينات في مرحلة مبكرة من عمر الجنين مما تؤدي إلى الإصابة به.

## 5- أسباب ابيوكيميائية:

و هو حدوث خلل في بعض النواقل العصبية مثل ( السيروتين و الدوبامين، الببتيدات العصبية) حيث أن الخلل البيوكيميائي في هذه النواقل من شأنه أن يؤدي إلى آثار سلبية في المزاج و الذاكرة و إفراز الهرمونات و تنظيم حرارة الجسم و إدراك الألم.

## 6- أسباب أفضية:

و هي عدم مقدرة أطفال التوحد على هضم البروتينات و خصوصا بروتين الجلوتين الموجود في الحليب مما يؤدي إلى ظهور الببتيد غير المهضوم و الذي يصبح له تأثير تخثيري يشبه تأثير الأفيون و المورفين.

## 7- التلوث البيئي:

يرى بعض الباحثين أن تعرض الطفل في مراحل نموه إلى التلوث البيئي مما يحدث تلف دماغي في الدم (الزئبق و المادة الحافظة للمطاط و الرصاص و أول أكسيد الكربون)

### أعراض التوحد:

يولد الطفل سليماً و غالباً لا يكون هناك مشاكل خلال الحمل أو عند الولادة و عادة ما يكون الطفل وسيماً ذو تقاطيع جذابة و ينمو هذا الطفل فكراً و جسمياً بصورة طبيعية سليمة حتى بلوغ سن الثانية أو الثالثة من العمر ثم فجأة تبدأ الأعراض بالظهور و تتمثل في :

### 1- اضطراب العلاقات الاجتماعية:

أ- عدم الإدراك والإحساس بوجود الآخرين.

ب- عدم طلب المساعدة من الآخرين في وقت الشدة.

ج- انعدام أو نقص القدرة على المحاكاة

د- انعدام التواصل و اللعب مع الآخرين.

هـ - عدم القدرة على بناء صداقات مع أقرانه.

### 2- اضطراب التواصل و التخيل:

أ- عدم وجود وسيلة للتواصل مع الآخرين.

ب- اضطراب في التواصل غير اللغوي

ج- عدم وجود القدرات الإبداعية

د- اضطراب شديد في القدرة الكلامية.

3- محدودية النشاط و المشاركة مع الآخرين:

أ- نمطية حركة الجسم

ب- الانهماك الكامل في اللعب

ج- مقاومة تغيير البيئة المحيطة به.

د- الحرص على الرقابة بدون سبب.

### تشخيص التوحد:

من الأمور المهمة و الصعبة في التوحد هو التشخيص بسبب ما يحمله هذا المرض من تعدد الأعراض و اختلافها و تداخلها مع اضطرابات أخرى، لذا أصبحت عملية التشخيص مسألة معقدة و يجب أن يكون التشخيص من قبل فريق متخصص متكامل يتكون من (طبيب الأطفال، أخصائي نفسي، اختصاصي السمع و التخاطب و طبيب أعصاب...إلخ)

و يبقى التشخيص بعيدا عن المختبرات و مواد التحليل و الأشعة بل معتمد على مواد الملاحظة لسلوك المصاب في العيادة الخاصة و المنزل و إجراء بعض الاختبارات و التخطيط السمعي و غيرها.

لكي يكون التشخيص دقيق و شامل يجب معرفة درجة الإصابة و نوع العلاج و التدريب الذي يحتاجه المصاب و هذا نظرا لكثرة الأعراض المرضية في التوحد و لتشابه الأعراض و وجودها في حالات مرضية أخرى فقد قامت جمعية طب النفس الأمريكية بوضع قاعدة عامة للتشخيص حيث تحتوي هذه القاعدة على 12 عرض مرضي من ثلاث مجموعات و يشترط في التشخيص وجود ما لا يقل عن ستة أعراض على الأقل من المجاميع الثلاثة.

### - العلاج

لقد تعددت أساليب التدخل العلاجي و التأهيل.

### 1- استخدام التحليل النفسي:

لقد كان علاج الذاتوية باستخدام جلسات التحليل النفسي و هو الأسلوب السائد حتى السبعينات من القرن السابق، و على أية حال هناك من يرى أن العلاج باستخدام التحليل النفسي يشتمل على مرحلتين:

### المرحلة الأولى:

يقوم المعالج بتزويد الطفل بأكبر قدر ممكن من التدعيم و تقديم الإشباع و تجنب الإحباط مع التفهم و الثبات الانفعالي من قبل المعالج.

### المرحلة الثانية:

يركز المعالج النفسي على تطوير المهارات الاجتماعية، كما تتضمن هذه المرحلة على تأجيل و إرجاء الإشباع و الإرضاء. (خطاب، 2009، ص87)

### 2- استخدام العلاج السلوكي (تعديل السلوك):

و تقوم فكرة تعديل السلوك على مكافأة (إثابة) السلوك الجيد أو المطلوب بشكل منتظم مع تجاهل مظاهر السلوكيات الأخرى غير المناسبة تماما، و ذلك في محاولة للسيطرة على السلوك الفوضوي لدى الطفل و ترجع أسباب اختيار العلاج السلوكي إلى:

- أنه أسلوب علاجي مبني على مبادئ يمكن أن يتعلمها الناس من غير المتخصصين.

- أنه أسلوب يمكن قياس تأثيره بشكل علمي واضح دون عناء.

- أنه أسلوب يتضمن نظام ثابت لإثابة و مكافأة السلوك الذي يهدف إلى تكوين وحدات استجابية صغيرة متتالية و متتابعة تدريجيا عن طريق المعززات.

### 3- استخدام العلاج البيئي:

و هو علاج طبي نفسي يقوم على أساس تعديل أو تناول ظروف حياة المريض أو بيئته المباشرة. و هذا الشكل من العلاج هو محاولة لتنظيم الوسط الاجتماعي و الفيزيقي الذي يعيش فيه المريض أو الذي يتعامل فيه على نحو يساعد في الوصول إلى الشفاء.

إذا هذا العلاج يستخدم عن طريق تقديم برامج للطفل تعتمد على الجانب الاجتماعي عن طريق التشجيع والتدريب على إقامة العلاقات الشخصية المتبادلة. (الزعلول، 2000، ص115)

### 4- العلاج الطبي:

إن أهداف التدخل العلاجي الطبي تختص بتخفيف الأعراض السلوكية و تعويض غياب المهارات الأساسية للحياة اليومية مثل: التواصل، رعاية الذات و تحقيق قدر و لو محدود من التفاعل و النمو

الاجتماعي، فضلا عن حاجة والدي الطفل و الأسرة ككل للتوجيه الذاتي و التدريب على تقبل الأمر الواقع.

-أما عن العقاقير التي استخدمت لذات الأعراض نذكر: ( fenfluramine ) الذي يخفض نسب السيروتونين ( ناقل عصبي) في الدم sérotonine و الذي كان له تأثير فعال في بعض حالات التوحد.

#### 5- العلاج باستخدام النظام الغذائي و الفيتامينات:

لقد قدم الدكتور ( Bernard Rimland ) عام 1996 تقريرا مختصرا عن وسائل بديلة لعلاج أطفال التوحد منها الغذاء، و بخاصة جرعة من فيتامين B<sub>6</sub> و المغنزيوم و علاج حساسيات الطعام، و علاج العدوى الميكروبية، و كذا علاج اختلال الجهاز المناعي.

- و قد أثبتت أبحاثه أيضا أن فيتامين ج قد سبب تحسن في مرض الاكتئاب، و هوس الاكتئاب و الذي يبدو مرتبطا جينيا بالتوحد. (بطرس، 2008، ص420-421)