

1^{ere} master Parasitologie

Fièvre de lassa

Dr. Benameur Nassima

2019/2020

Fièvre de lassa

Définition

- La fièvre de Lassa est une arenavirose reconnue en 1969 en Afrique. Le 1er cas a été étudié dans un village du Nigeria, Lassa
- La FHVL est une zoonose, ce qui signifie que l'homme est contaminé avec des animaux infectés.
- l'hôte du virus est un rongeur communément appelé "rats à mamelles multiples" qui excrète le virus dans ses urines et ses excréments.
- se transmet d'homme à homme par contact direct avec le sang, l'urine, les excréments ou autres sécrétions organiques d'une personne contaminée.
- La probabilité pour un sujet de mourir lorsqu'il est atteint de la FHVL est de 1%. Cette probabilité peut atteindre 15% dans les formes sévères (OMS, 2016)

Fièvre de lassa

Symptômes

- Se manifestent entre 2 à 21 jours après avoir été en contact avec le virus
- Dans la plupart des cas reste asymptomatique
- Fièvre
- Douleurs thoracique et musculaire
- Dans les cas graves hémorragie de la bouche, du nez, du vagin ou des voies digestives
- Céphalées
- Nausées, vomissement et diarrhée
- Gorge irritée
- Œdème du visage (OMS,2018)

Fièvre de lassa

Diagnostic

L'isolement de l'arénavirus responsable à partir du sang et des sécrétions pharyngées, par RT-PCR, toujours associée au diagnostic sérologique.

Fièvre de lassa

Traitement

Essentiellement symptomatique ; sérothérapie possible à l'aide de **sérum de convalescent**.


On a préconise l'emploi d'un antiviral : la **Ribavirine**.

Fièvre de lassa

Prévention

- En milieu médical, le personnel doit toujours prendre les précautions d'usage en matière de prévention et de lutte contre les infections associées aux soins quand ils s'occupent des patients quel que soit le diagnostic présumé.
- L'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire, le port d'un équipement de protection individuelle, la sécurité des injections et des rites funéraires.
- Les personnels de laboratoire sont aussi assujettis à ces mesures de sécurité dans la manipulation des prélèvements des malades
- Quand on pense avoir la FHVL, il faut éviter les contacts avec une autre personne, consulter immédiatement un professionnel de santé et boire beaucoup d'eau. (OMS, 2016)
- Protégeons nos aliments des rats en les couvrant correctement
- Maintenons nos maisons et alentours propres afin d'empêcher les invasions des rats

Distribution géographique de la fièvre de Lassa dans les pays d'Afrique de l'Ouest, 1969–2018



Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes discontinues et en pointillés sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

Source des données: Organisation mondiale de la Santé
Production cartographique: Information, bases factuelles et recherche (IER)
Organisation mondiale de la Santé



© OMS 2018. Tous droits réservés.