

الجزء الثاني : التحليل الرياضي

Part Two : Mathematical analysis 2

الفصل الرابع

حساب التكاملات *Integrals calculus*

فهرس الفصل

109		<i>Primitive functions</i> الدالة الأصلية	1.4
111		Definite integral التكامل المحدود	1.1.4
113		<i>Properties of integrals</i> خواص التكاملات	2.4
113		Chasles relation علاقة شال	1.2.4
114		Positivity of integration إيجابية التكامل	2.2.4
114		Linearity of integration خطية التكامل	3.2.4
118		<i>Primitive of usual functions</i> تكامل بعض الدوال المألوفة	3.4
118		<i>Integration methods</i> طرق التكاملات	4.4
119		Integration per partes التكامل بالتجزئة	1.4.4
122		Change of variables التكامل بتغيير المتغير	2.4.4
124		<i>Exercise series N° 4</i> سلسلة التمارين رقم 4	5.4

1.4 الدالة الأصلية *Primitive functions*

تعريف - Definition 1.1.4 :

ليكن $I = [a, b]$ مجال في $\mathbb{R}$ والنكن f دالة حيث :

Let $I = [a, b]$ is a non-empty open interval in $\mathbb{R}$ and let the function $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

نقول أن F دالة أصلية للدالة f على I حيث :

We call F a primitive function of f on I such that:

$$F : I \rightarrow \mathbb{R}$$

إذا تحقق ما يلي:

satisfying:

-1 F قابلة للإشتقاق على المجال المفتوح I .

F can be derived in the open interval I .

-2

$$\forall x \in I, F'(x) = f(x)$$

نظرية - Theorem 1.1.4 :

إذا كانت F دالة أصلية للدالة $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ على I فإن F مستمرة على I .

If F is a primitive function of $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ on I , then F is continuous on I .

نظرية - Theorem 2.1.4 :

لنكن الدالة $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ حيث f تملك دالة أصلية على I

Let $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ has a primitive function on I . Then :

مجموعة الدوال الأصلية للدالة f هي

the set of primitive functions of f is:

$$\{F + c, c \in \mathbb{R}\},$$

حيث F دالة أصلية خاصة للدالة f .

where, F is a primitive function of f .

All primitive functions of f are obtained by shifting any primitive function of f by a constant.

نرمز بـ $\int f(t)dt$ للدالة الأصلية للدالة f ونكتب:

We denote by $\int f(t)dt$ the primitive function of f and we write:

$$F(x) = \int f(x)dx.$$

1.1.4 التكامل المحدود Definite integral

هناك نوعان من التكاملات هما: التكاملات المحدودة والتكاملات غير المحدودة.

There are two types of integrals: definite integrals and indefinite integrals.

لنكن الدالة $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ والمستمرة على المجال $[a, b]$ حيث $b \geq a$.

Let $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ the continues function on $[a, b]$ such that $b \geq a$.

يمكن تعريف التكامل بطريقة أخرى أكثر استعمالاً في إيجاد قيم ثابتة للتكاملات من خلال النظرية التالية:

Integration can be defined in another way that is more used to find constant values for the integrals through following theorem:

نظرية - 3.1.4 : Theorem

لنكن الدالة $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ المعرفة

Let $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ be the function defined as:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

هي دالة أصلية للدالة f يعني أن الدالة F قابلة للإشتقاق ونحقق :

a primitive function of f means that F derivable and satisfying :

$$F'(x) = f(x), \forall x \in [a, b].$$

تعريف - Definition : 2.1.4

نسمي التفاضل المحدود للدالة f العدد الحففي الذي يعبر على المساحة المحصورة بمنحنى الدالة $f(x)$ من النقطة ذات الفاصل $x = a$ إلى النقطة ذات الفاصل $x = b$ ، الذي نرمز له بالرمز :

The definite integral of f is a number which represents the area under the curve $f(x)$ from $x = a$ to $x = b$ denoted by:

$$\int_a^b f(x) dx$$

العدد الحففي $F(b) - F(a)$ حيث F هي الدالة الأصلية للدالة f وتكتب

The real number $F(b) - F(a)$ where F the primitive function of f and we write:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

مثال - Example : 1.1.4

Let's calculate the following integrals:

لنحسب التفاضلات التالية:

1- من أجل $f(x) = e^x$ لنكن $F(x) = e^x$ دالة أصلية لها، ومنه

For $f(x) = e^x$ let $F(x) = e^x$ be its primitive function, then

$$\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1.$$

2- من أجل $g(x) = x^2$ لنكن $G(x) = \frac{x^3}{3}$ دالة أصلية لها، ومنه

For $g(x) = x^2$ let $G(x) = \frac{x^3}{3}$ be its primitive function, then

$$\int_0^1 x^2 dx = [\frac{x^3}{3}]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

-3

$$\int_a^x \cos t \, dt = [\sin t]_{t=a}^{t=x} = \sin x - \sin a$$

دالة أصلية للدالة $\cos x$.

is a primitive function of $\cos x$.

-4 إذا كانت دالة فردية تكون دالتها الأصلية دالة زوجية (نبرهن لاحقاً) ونستنتج أن :

If the function is odd, then its primitive function is be an even function (proved later).

We conclude that:

$$\int_{-a}^a f(t) \, dt = 0.$$

2.4 خواص التكاملات Properties of integrals

الخصائص الرئيسية الثلاثة لحساب التكامل هي علاقة شال، إيجابية وخطية التكاملات.

The three main properties to integral calculus are the relation Chasles, positivity and linearity of integral.

1.2.4 علاقة شال Chasles relation

1.2.4 : Proposition - قضية

لنكن $a < c < b$. إذا كان f دالة قابلة للتكامل على $[a, c]$ و $[c, b]$ ، عندها تكون f قابلة للتكامل على $[a, b]$.

Let $a < c < b$. If f integrable on $[a, c]$ and $[c, b]$ then f integrable on $[a, b]$.

and we have:

ولدينا:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx.$$

We have the following proprieties, for $a = b$:

لدينا الخاصية التالية من أجل $a = b$:

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0.$$

and for $a < b$:

و من أجل $a < b$:

$$\int_b^a f(x)dx = - \int_a^b f(x)dx.$$

مثال - Example : 2.2.4

We have:

لدينا:

$$\begin{aligned}\int_1^3 x^2 dx &= \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3} \\ \int_3^1 x^2 dx &= \left[\frac{x^3}{3} \right]_3^1 = \frac{1}{3} - \frac{27}{3} = -\frac{26}{3} \\ \int_1^3 x^2 dx &= - \int_3^1 x^2 dx.\end{aligned}$$

2.2.4 إيجابية التكامل Positivity of integration

قضية - Proposition : 2.2.4

ليكن $a \leq b$ عددين حقيقيين، f و g دالتين قابلتين للتكامل على المجال $[a, b]$.

Let $a \leq b$ two real numbers, f and g two functions have a primitive functions on $[a, b]$.

If $f \leq g$ then:

إذا كان $f \leq g$ فإن

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

على وجه الخصوص ، يكون تكامل الدالة الموجبة إيجابيا:

In particular, the integral of a positive function is positive:

If $f \geq 0$ then:

إذا كانت $f \geq 0$ فإن :

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

3.2.4 خطية التكامل Linearity of integration

3.2.4 : Proposition - قضية

لنكن f و g دالتين قابلتين للتفاضل على المجال $[a, b]$

Let f and g two functions have a primitive on $[a, b]$

then $f + g$ a function integrable and

1- و منه $f + g$ دالة قابلة للتفاضل و

$$\int_a^b (f + g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

2- من أجل كل عدد حقيقي λ الدالة λf هي قابلة للتفاضل و لدينا

For all real number λ the function λf is integrable and we have:

$$\int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx.$$

من خلال هاتين النقطتين الأوليتين لدينا خطبة التفاضل:

From these first two points we have the linearity of integration:

For all real numbers λ and μ we have:

من أجل كل عدد حقيقي λ و μ لدينا:

$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx.$$

1.2.4 : Remark - ملاحظة

(1) إذا كانت f و g دالتين قابلتين للتفاضل على المجال $[a, b]$ فإن في معظم الأحيان

If f and g are integrable functions on $[a, b]$ then most of the time we have:

$$\int_a^b (fg)(x) dx \neq \left(\int_a^b f(x) dx \right) \left(\int_a^b g(x) dx \right).$$

(2) إذا كانت f دالة قابلة للتفاضل على المجال $[a, b]$ فإن $|f|$ دالة قابلة للتفاضل على المجال $[a, b]$ أيضا و لدينا:

If f is an integrable function on $[a, b]$ then $|f|$ is also an integrable function on $[a, b]$

and we have:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

مثال - Example : 3.2.4

We have:

لدينا:

$$\int_0^1 (7x^2 - e^x) dx = 7 \int_0^1 x^2 dx - \int_0^1 e^x dx = 7 \frac{1}{3} - (e - 1) = \frac{10}{3} - e$$

Using the calculations we saw earlier, we find:

باستخدام الحسابات التي رأيناها سابقا نجد:

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

and

$$\int_0^1 e^x dx = e - 1.$$

9

مثال - Example : 4.2.4

Let

ليكن

$$I_n = \int_1^n \frac{\sin(nx)}{1+x^n} dx$$

Let's prove that $I_n \rightarrow 0$ for $n \rightarrow +\infty$.

لنتبث أن $I_n \rightarrow 0$ لما $n \rightarrow +\infty$.

$$|I_n| = \left| \int_1^n \frac{\sin(nx)}{1+x^n} dx \right| \leq \int_1^n \frac{|\sin(nx)|}{1+x^n} dx \leq \int_1^n \frac{1}{1+x^n} dx \leq \int_1^n \frac{1}{x^n} dx$$

It remains only for us to calculate this last integral

يبقى فقط حساب هذا التكامل الأخير

$$\int_1^n \frac{1}{x^n} dx = \int_1^n x^{-n} dx = \left[\frac{x^{-n+1}}{-n+1} \right]_1^n = \frac{n^{-n+1}}{-n+1} - \frac{1}{-n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

لأن $n^{-n+1} \rightarrow 0$ و $\frac{1}{-n+1} \rightarrow 0$ لما $n \rightarrow +\infty$.
 because $n^{-n+1} \rightarrow 0$ and $\frac{1}{-n+1} \rightarrow 0$ for $n \rightarrow +\infty$.

ملاحظة - Remark : 2.2.4

نلاحظ أنه حتى ولو كانت $f \cdot g$ قابلة للتكامل فإنه على العموم

We note that even if $f \cdot g$ is an integrable function, in general we have:

$$\int_a^b (fg)(x)dx \neq \left(\int_a^b f(x)dx \right) \left(\int_a^b g(x)dx \right).$$

على سبيل المثال، لنأخذ الدالتين f و g المعرفتين كمايلي:

For example, let the functions f and g be defined as follows:

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, \frac{1}{2}[\\ 0 & \text{si non.} \end{cases}$$

and

$$g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [\frac{1}{2}, 1[\\ 0 & \text{si non.} \end{cases}$$

و منه $f(x) \cdot g(x) = 0$ من أجل كل $x \in [0, 1]$ ، إذن:

Hence $f(x) \cdot g(x) = 0$ for each $x \in [0, 1]$, then:

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx = 0$$

although

رغم أن

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \quad \text{and} \quad \int_0^1 g(x) dx = \frac{1}{2}.$$

3.4 تكامل بعض الدوال المألوفة *Primitive of usual functions*

$\int e^x dx = e^x + c$ on $\mathbb{R}$ على
$\int \cos x dx = \sin x + c$ on $\mathbb{R}$ على
$\int \sin x dx = -\cos x + c$ on $\mathbb{R}$ على
$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$, $(n \in \mathbb{N})$ on $\mathbb{R}$ على
$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$, $(\alpha \in \mathbb{R}_{\{-1\}})$ on $]0, +\infty[$ على
$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + c$ on $]0, +\infty[$ أو $]-\infty, 0[$ على
$\int shx dx = chx + c$, $\int chx dx = shx + c$ on $\mathbb{R}$ على
$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + c$ on $\mathbb{R}$ على
$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} \arcsin x + c \\ \frac{\pi}{2} - \arccos x + c \end{cases}$ on $] -1, 1[$ على
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \begin{cases} \text{Argsh}(x) + c \\ \ln(x + \sqrt{x^2+1}) + c \end{cases}$ on $\mathbb{R}$ على
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \begin{cases} \text{Argch}(x) + c \\ \ln(x + \sqrt{x^2-1}) + c \end{cases}$ on $x \in]1, +\infty[$ على

4.4 طرق التكامل *Integration methods*

يقوم حساب التكامل على إيجاد التابع الأصلي للدالة التي نريد القيام بمكاملتها. وقد عرض غوتفريد فيلهيلم لايبنتز، في 13 نوفمبر 1675، أول عملية تكامل لحساب المساحة. وقد أسس لايبنتز علم التفاضل والتكامل الرياضي بشكل مستقل عن إسحاق نيوتن كما أن رموزه الرياضية ما زالت تستخدم بشكل شائع منذ أن تم نشرها والتعريف بها. ويوجد عدة طرق للتكامل منها: التكامل بالتجزئة، التكامل بالتعويض، التكامل بتغيير المتغير، ...

Integration is based on finding the primitive function of the function we want to integrate. On November 13, 1675, Gottfried Wilhelm Leibniz demonstrated the first integral for calculating area. Leibniz established the mathematical calculus independently of Isaac Newton, and his mathematical symbols are still in common use since they were first published. There are several methods of integration, including: integration by parts, integration by substitution, integration by changing the variable, ...

1.4.4 التكامل بالتجزئة Integration per partes

4.4.4 : Theorem - نظرية

لكن u و v دالتين من الفئة C^1 المعرفتين على المجال $[a, b]$ فإن :
 Let u and v two functions of the class C^1 defined on $[a, b]$, then :

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx.$$

صيغة التكامل بالتجزئة للدالة الأصلية هي نفسها ولكن بدون حدود:

The formula for the fractional integral for the primitive function is the same but without bounds:

$$\int u(x) v'(x) dx = [uv] - \int u'(x) v(x) dx.$$

5.4.4 : Example - مثال

To calculate the integral

لحساب التآمل

$$\int_0^1 x e^x dx$$

We put $u(x) = x$ and $v'(x) = e^x$.

نضع $u(x) = x$ و $v'(x) = e^x$.

نعلم أن الدالة $u'(x) = 1$ هي الدالة المشتقة للدالة $u(x)$

We know that the function $u'(x) = 1$ is the derivative of the function $u(x)$

و الدالة $v(x) = e^x$ هي الدالة الأصلية للدالة v'

and the function $v(x) = e^x$ is the primitive function of v'

و باستعمال صيغة التآمل بالتجزئة نجد:

by using the integration by parts formula we find:

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 x e^x dx &= \int_0^1 u(x) v'(x) dx \\
 &= [u(x) v(x)]_0^1 - \int_0^1 u'(x) v(x) dx \\
 &= [x e^x]_0^1 - \int_0^1 1 \cdot e^x dx \\
 &= (1 \cdot e^1 - 0 \cdot e^0) - [e^x]_0^1 \\
 &= e - (e^1 - e^0) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

6.4.4 : Example - مثال

To calculate the integral

لحساب التكامل

$$\int_1^e x \ln x dx.$$

نضع هذه المرة $u(x) = \ln x$ و $v'(x) = x$

This time we put $u(x) = \ln x$ and $v'(x) = x$.

و منه الدالة $u' = \frac{1}{x}$ هي الدالة المشتقة للدالة $u(x)$ و الدالة $v = \frac{x^2}{2}$ هي الدالة الأصلية للدالة v'

The function $u' = \frac{1}{x}$ is the derivative of $u(x)$ and the function $v = \frac{x^2}{2}$ is the primitive of v' .

و باستعمال صيغة التكامل بالجزء نجد:

by using the integration by parts formula we find:

$$\begin{aligned}
 \int_1^e \ln x \cdot x dx &= \int_1^e uv' = [uv]_1^e - \int_1^e u'v = \left[\ln x \cdot \frac{x^2}{2} \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \frac{x^2}{2} dx \\
 &= \left(\ln e \frac{e^2}{2} - \ln 1 \frac{1^2}{2} \right) - \frac{1}{2} \int_1^e x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e \\
 &= \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}.
 \end{aligned}$$

7.4.4 : Example - مثال

To calculate the integral

لحساب التكامل

$$\int \arcsin x dx$$

لإيجاد دالة أصلية للدالة $\arcsin(x)$

to finds a primitive function of the $\arcsin(x)$ function

نجعلها من شكل جداء حيث نضع $u(x) = \arcsin(x)$ و $v'(x) = 1$

we make it in the form of a product, we put $u(x) = \arcsin(x)$ and $v'(x) = 1$,

حيث لدينا $u'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ و $v(x) = x$

where we have $u'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ and $v(x) = x$,

ثم نطبق صيغة التكاملات بالجزء فنجد

then we use the integration by parts formula we find:

$$\begin{aligned} \int 1 \cdot \arcsin(x) dx &= [x \arcsin(x)] - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= [x \arcsin(x)] - \left[-\sqrt{1-x^2} \right] \\ &= x \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + c. \end{aligned}$$

مثال - Example : 8.4.4

حساب التكاملات

To calculate the integral

$$\int x^2 e^x dx.$$

نضع $u(x) = x^2$ و $v'(x) = e^x$

we put $u(x) = x^2$ and $v'(x) = e^x$.

نعلم أن الدالة $u'(x) = 2x$ هي الدالة المشتقة للدالة $u(x)$

We know that the function $u'(x) = 2x$ is the derivative of $u(x)$

و الدالة $v(x) = e^x$ هي الدالة الأصلية للدالة $v'(x)$

and $v(x) = e^x$ is the primitive function of $v'(x)$

و باستعمال صيغة التكاملات بالجزء نجد:

and by using the integration by parts formula we find:

$$\int x^2 e^x dx = [x^2 e^x] - 2 \int x e^x dx$$

نعيد التكاملات بالجزء للمرة الثانية على الجزء الثاني من المساوات السابقة نجد:

Re-integrating by parts for the second time on the second part of the previous equations,

we find:

$$\int x e^x dx = [x e^x] - \int e^x dx = (x - 1)e^x + c,$$

finally we find

في الأخير نجد

$$\int x^2 e^x dx = (x^2 - 2x + 2)e^x + c.$$

2.4.4 التكامل بتغيير المتغير Change of variables

5.4.4 : Theorem - نظرية

لنكن f دالة معرفة على المجال $I = [a, b]$ و لبتن النفايل $\varphi : J \rightarrow I$ من الفئة $\mathcal{C}^1$.

Let f be a function defined on $I = [a, b]$ and let the mapping $\varphi : J \rightarrow I$ be in class $\mathcal{C}^1$.

for all $a, b \in J$ we have:

من أجل كل $a, b \in J$ لدينا:

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt$$

إذا كانت F دالة أصلية للدالة f فإن $F \circ \varphi$ هي الدالة الأصلية للدالة $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$.

if F is a primitive function of f then $F \circ \varphi$ is the primitive function of $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$.

in another way

بصفة أخرى

$$\left(\int f(x) dx \right) \circ \varphi = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

أي أن الدالة الأصلية للدالة $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ تنتج من تركيب كل من الدالة f و φ .

that is, the primitive function $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ results from the combination of f and φ .

العبارة $\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$ تمثل فعلا تغيير للمتغير،

the statement $\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$ is actually a change of the variable,

or in a simplified form we put

أو بصيغة مبسطة نضع

$$x = \varphi(t)$$

after derivation, we find

ومنه نجد بعدها بالإشتقاق

$$\frac{dx}{dt} = \varphi'(t)$$

i.e.

أي

$$dx = \varphi'(t) dt$$

what it gives us:

ما يعطينا :

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

9.4.4 : Example - مثال

Calculate the integral

حساب التفاضل

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x) \cos(x) dx$$

by placing

بوضع

$$\sin(x) = t \implies \sin(x)' = \cos(x) = dt$$

ومن ثم نختار حدود التفاضل من x الى t كما يلي

Hence, the bounds of integration change from x to t as follows

$$\begin{aligned} x &= 0 \implies t = \sin(0) = 0 \\ x &= \frac{\pi}{2} \implies t = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \end{aligned}$$

from it we find

ومن ثم نجد

$$\begin{aligned} x &= 0 \implies \sin(0) = 0 \\ x &= \frac{\pi}{2} \implies \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x) \cos(x) dx &= \int_0^1 t^2 dt \\ &= \left[\frac{1}{3} t^3 \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$