

Université Mohamed Khider, Biskra
 Faculté des Sc. Exactes et Sc. de la Nature et la Vie
 Département de Mathématiques
 Master 1: 2021/2022

Interrogation 1 (modèle linéaire)

Soit X la matrice centrée des données ayant les colonnes X_1, X_2, X_3, X_4 et les lignes e_1, e_2, e_3 . On note par V la matrice de variance covariance associée à X . Supposons que les valeurs propres de V sont $\lambda_4 = 3, \lambda_3 = 2, \lambda_2 = 1, \lambda_1 = 0$.

1. Donner la formule théorique de V . (1pt)
2. Dans le cadre de l'ACP, que représente $\lambda_4, \lambda_3, \lambda_2, \lambda_1$? (1pt)
3. Déterminer le centre de gravité de $\{e_1, e_2, e_3\}$, noté g . (1pt)

On note par E_1, E_2, E_3, E_4 les axes principaux.

4. Déterminer le sous-espace orthogonal de E_1 noté E_1^\perp . (1pt)
5. Déterminer la distance au carré entre e_1 et E_1^\perp . Que représente cette distance? (1pt)
6. Déterminer la moyenne des distances (au carré) entre g et tout les e_i . Que représente cette distance? (1pt)
7. Déterminer l'inertie par rapport à l'orthogonal de E_4 . Discuter cette inertie. (1pt)

Soit X'_1, X'_2, X'_3, X'_4 les colonnes de la matrice X dans la nouvelles base $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ associée aux axes principaux.

8. Que représentent les vecteurs X'_1, X'_2, X'_3, X'_4 ? (1pt)
9. Déterminer la somme des variances des X'_i . Que représente cette somme? (1pt)
10. La somme des cosinus (au carré) des angles formées par $\{X_1, X'_1\}$ et $\{X_1, X'_2\}$ vaut 1. Que peut-on conclure? (1pt)

Solution

1. $V = \frac{1}{3}X^tX$.
2. Les valeurs propres $\lambda_1^* = 3, \lambda_2^* = 2, \lambda_3^* = 1$ et $\lambda_4^* = 0$, représentent les inerties par rapport $E_1^\perp, E_2^\perp, E_3^\perp$ et E_4^\perp respectivement (ou les inerties expliquées par les axes principaux E_1, E_2, E_3 et E_4).
3. Comme la matrice X est centrée (c'est à dire les colonnes sont centrés) alors le centre de gravité est $g = 0_{\mathbb{R}^4}$.
4. $E_1^\perp = E_2 \oplus E_3 \oplus E_4$.
5. $d^2(e_1, E_1^\perp)$ est l'abscisse (au carré) du vecteur e_1 dans le sous-espace $E_1 \oplus E_2$ qui représente la projection (au carré) de e_1 sur l'axe E_1 .
6. $\lambda_1^* + \lambda_2^* + \lambda_3^* + \lambda_4^* = 6$ qui représente l'inertie totale I_T .
7. $I_{E_4^\perp} = \lambda_4^* = 0$. Le nuage de points $\{e_1, e_2, e_3\}$ est représenté en totalité dans le sous-espace vectoriel $E_1 \oplus E_2 \oplus E_3$.

8. Les composantes principales.

9. $\lambda_1^* + \lambda_2^* + \lambda_3^* + \lambda_4^* = 6$ qui représente l'inertie totale I_T .

10. X_1 a une forte corrélation avec les deux composantes principales X'_1 et X'_2 et n'est pas corréllé ni avec X'_3 ni avec X'_4 . En d'autres termes, X_1 a une parfaite représentation dans le cercle de corrélation.